



## 蝙蝠寶寶代奶配製

可以一次配製 10CC 或 50CC 後分裝，每次取少量隔水加溫後再餵食。  
約 3~4 小時餵一次，以觀察寶寶腹部為主。

方法一 代奶配製各成分比例如下

100 CC 的動物奶

1.5CC 的有機食用油或玉米油

0.5CC 的冷榨亞麻油

1.5 匙（12.9 公克）的黃豆粉

2 茶匙（4.3 公克）的蛋黃

出生前三週的寶寶減少油的量

如果發現寶寶的便便鬆軟的話，油的量減半。

可參考下圖藍色框框的比例改變營養成分

**TABLE 9-1**  
**COMPARISON OF BAT MILK COMPOSITIONS**

	<b>Fat</b> %	<b>Protein</b> %	<b>Carbohydrate</b> %	<b>Energy</b> kJ/g
<b>Family: Vespertilionidae</b>				
<i>Eptesicus fuscus</i>				
Early lactation	12.8	9.5	3.6	6.7
Late lactation	21.2	9.5	3.6	10.5
<i>Myotis lucifugus</i>				
Early lactation	12.4	9.4	3.9	7.4
Late lactation	15.8	8.5	3.9	8.6
<b>Milk replacement recipe: Vespertilionidae</b>	8.2	7.3	9.8	5.6

參考資料：Standards and Medical Management for Captive Insectivorous Bats



方法二 修改國外建議配方，以台灣寵物用品店易購買到品調配。代奶配製各成分比例如下

10 公克的動物奶粉（建議用貓奶粉）

35CC 的水

0.1CC 的有機食用油或玉米油

0.1CC 的冷榨亞麻油（可用微量）

2~4 公克 蛋黃粉

開始餵食時蛋黃粉可從 1 公克逐漸增加，前兩週增加至 2 公克，兩週後可逐漸增加至 4 公克。

出生前三週的寶寶減少油的量

如果發現寶寶的便便鬆軟的話，油的量減半。